

KARTIČKA PACIENTA

Mějte tuto kartičku stále u sebe a ukažte ji při každé návštěvě lékaře.

Důležité informace o bezpečnosti přípravku Forxiga (dapagliflozin) – pouze pro pacienty s diabetem 1. typu

Forxiga může přispět k rozvoji lékařského problému označovaného jako diabetická ketoacidóza (DKA). Pokud není DKA léčena, může být závažná nebo vést k úmrtí. Příznaky DKA zahrnují:

Ústa a žaludek: pocit na zvracení nebo zvracení, bolest žaludku, velká žízeň/sucho v ústech (známky dehydratace), nasládlá nebo kovová chuť v ústech.

Dech, dýchání a zápach: rychlé a hluboké dýchání, nasládlý zápach z úst, odlišný zápach moči nebo potu.

Další příznaky: zvýšená hladina ketonů v moči nebo v krvi, rychlý úbytek tělesné hmotnosti, zmatenost, pocit nezvyklé ospalosti či únavy.

Jestliže máte známky/příznaky DKA, poraďte se s lékařem nebo navštivte ihned nemocnici a přestaňte ihned užívat přípravek Forxiga.

Pamatujte si:

U pacientů, kteří užívají přípravek Forxiga, se může objevit DKA, i když je hladina cukru v krvi nižší než 14 mmol/l (250 mg/dl). Tento stav se nazývá euglykemická DKA.

Kontaktní informace pro Vás a pro Vašeho lékaře

Vaše jméno: _____

Jméno lékaře, který přípravek Forxiga předepsal: _____

Telefonní číslo na lékaře: _____

Datum zahájení léčby přípravkem Forxiga: _____

Kontakt na blízkou osobu pro případ nouze: _____

Telefonní číslo blízké osoby: _____

Informace pro lékaře, lékárníky a zdravotní sestry

Tento pacient užívá přípravek Forxiga (dapagliflozin) k léčbě diabetu 1. typu.

- Přípravek se používá jako přídavná léčba k inzulínu.
- Jedná se o „SGLT-2 inhibitor“.

Před chirurgickým zákrokem nebo hospitalizací z důvodu závažného akutního onemocnění přestaňte dočasně užívat přípravek Forxiga.

Jestliže se objeví známky DKA, ihned vyšetřete pacienta na diabetickou ketoacidózu (DKA)

- posuďte riziko DKA bez ohledu na hladinu glukózy v krvi.
- U pacientů, kteří užívají přípravek Forxiga, se může objevit DKA, i když je hladina cukru v krvi nižší než 14 mmol/l (250 mg/dl); stav se nazývá euglykemická DKA.

Léčba DKA

- **Pokud máte podezření na DKA:** zajistěte pacientovi lékařskou péči a ihned vysaďte přípravek Forxiga.
- **Léčba euglykemické DKA vyžaduje:** Pacientům s euglykemickou DKA má být podána glukóza, inzulín a tekutiny, léčba dapagliflozinem má být přerušena.

V žádném případě nevysazujte ani nepřerušujte léčbu inzulínem.

Tento materiál, pokyny pro pacienty a pečovatele a příbalová informace (PIL) jsou k dispozici on-line na adrese: www.sukl.cz